


檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國114年10月27日
發文字號：農授防字第1141878545A號



主旨：公告「得克派瑞」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日起生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駱季

「得克派瑞」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 10 月 27 日農授防字第 1141878545A 號公告

一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC/有效成分
得克派瑞	fluopyram + tebuconazole	(1)N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]ethyl}- α,α,α -trifluoro-o-tolamide (2)(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol


二、「得克派瑞」農藥使用方法與範圍一覽表

400 g/L (40% w/v) 得克派瑞 水懸劑(SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
胡瓜	白粉病	0.125 公升	6,000	病害發生初期開始施藥。	7	最多 2 次		3	避免重複使用含氟派瑞藥劑。	原始登記廠商名稱：台灣拜耳股份有限公司

農業部 公告

發文日期：中華民國114年10月27日
發文字號：農授防字第1141878545B號



主旨：公告修正「鮎澤蘇力菌ABTS-1857」農藥使用方法及其範圍
如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駱季

「鮎澤蘇力菌 ABTS-1857」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 10 月 27 日農授防字第 1141878545B 號公告修正

10.8% (7,000 DBMU/mg) 鮎澤蘇力菌 ABTS-1857 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
甘藍	小菜蛾	0.8-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					

48.1% (35,000 DBMU/mg) 鮎澤蘇力菌 ABTS-1857 水分散性粒劑 (WG)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
豆科乾 豆類	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
茶	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。					適用於茶 籽。	
油茶	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
十字花 科包葉 菜類	鱗翅目 害蟲	1-1.2 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
甘藍	小菜蛾	0.25-0.3 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				本劑試驗時 加著劑自然 油 1,500 倍。	
豆科小 葉菜類	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
十字花 科小葉 菜類	鱗翅目 害蟲	1-1.2 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
茄科小 葉菜類	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施						


作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
蔥	夜蛾類	1-1.5 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
菠菜	夜蛾類	0.8-1.0 公斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
豆科根 菜類	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
十字花 科根菜 類	鱗翅目 害蟲	1-1.2 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
茄科根 菜類	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
胡蘿蔔	夜蛾類	0.8-1.0 公斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
茄科果 菜類	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
豆菜類	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
草莓	夜蛾類	0.8-1.0 公斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
菊	夜蛾類	0.1-0.3 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
野薑	夜蛾類	0.3-0.6 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
蓮	夜蛾類	0.3-0.5 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
山茶	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
茶	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
蛇麻	鱗翅目 害蟲	0.5 - 1.5 公斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 3 次			本藥劑試驗 時添加農皂 作為展著劑 (稀釋 3,000 倍)。	本項新增。(主管 機關依據農藥 管理法第11條 以公務預算辦 理之田間試驗)

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國114年10月27日
發文字號：農授防字第1141878545C號



主旨：公告修正「鮎澤蘇力菌NB-200」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駱季

「鮎澤蘇力菌 NB-200」農藥使用方法及其範圍


中華民國 114 年 10 月 27 日農授防字第 1141878545C 號公告修正

54% (15,000 IU/mg) 鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑 (WG)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事 項	說明
蔬菜	鱗翅目 害蟲	0.5-2.0 公斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次				
番茄	夜蛾類	0.5-1.0 公斤	1,500	害蟲發生時 開始施藥。	7					
果樹	鱗翅目 害蟲	1.0-2.0 公斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次				
鳳梨	鱗翅目 害蟲	1.0-2.0 公斤	1,000	開花末期開 始施藥。	7	連續 3 次				
葡萄	鱗翅目 害蟲	1.0-2.0 公斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次				
山茶科 茶類	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。						
愛玉子	鱗翅目 害蟲	1.0-2.0 公斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次				
檳榔	鱗翅目 害蟲	1.0-2.0 公斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次				
咖啡	鱗翅目 害蟲	1.0-2.0 公斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次				
破布子	鱗翅目 害蟲	1.0-2.0 公斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次				
可可	鱗翅目 害蟲	1.0-2.0 公斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次				
蛇麻	鱗翅目 害蟲	0.5 - 1.5 公斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 3 次			本藥劑 試驗時 添加農 皂作為 展著劑 (稀釋 3,000 倍)。	本項新 增。(主管 機關依據 農藥管理 法第11條 以公務預 算辦理之 田間試驗)

農業部 公告

發文日期：中華民國114年10月27日
發文字號：農授防字第1141878545D號



主旨：公告修正「克凡派」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駱季

「克凡派」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 10 月 27 日農授防字第 1141878545D 號公告修正

10(%) (w/w) 克凡派 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
綠豆	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	適用於乾 豆。	
綠豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	適用於乾 豆。	
紅豆	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	適用於乾 豆。	
紅豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	適用於乾 豆。	
大豆	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	適用於乾 豆。	
大豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	適用於乾 豆。	
花豆	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	適用於乾 豆。	
花豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	適用於乾 豆。	
樹豆	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	適用於乾 豆。	
樹豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	適用於乾 豆。	
蠶豆	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	適用於乾 豆。	
蠶豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	適用於乾 豆。	
豇豆	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	適用於乾 豆。	
豇豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	適用於乾 豆。	
油菜	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	適用於油菜 籽。	
油菜	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	適用於油菜 籽。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
向日葵	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	避免於開花 期使用。	
向日葵	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	避免於開花 期使用。	
向日葵	薊馬類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30	避免於開花 期使用。	
油茶	夜蛾類	1-3 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21	避免於開花 期使用。	
油茶	毒蛾類	1-3 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21	避免於開花 期使用。	
胡麻	夜蛾類	0.6-1.2 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			30		
胡麻	薊馬類	0.6-1.2 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			15	採籽前 15 天停止施 藥。	
十字花 科包葉 菜類	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			14	避免於開花 期使用。	
十字花 科包葉 菜類	小菜蛾	1 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			14	避免於開花 期使用。	
十字花 科包葉 菜類	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			14	避免於開花 期使用。	
結球萵 苣	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			14		
結球萵 苣	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			14		
結球萵 苣	薊馬類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			14		
小葉菜 類	鱗翅目 害蟲	0.8-1.0 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
旋花科 小葉菜 類	夜蛾類	0.3-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
豌豆	螟蛾類	0.5-0.8	1,000	害蟲發生時	7			10	適用於葉用	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		公升		開始施藥。					豌豆	
豌豆	夜蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10	適用於葉用 豌豆	
豌豆	毒蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10	適用於葉用 豌豆	
豌豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10	適用於葉用 豌豆。	
十字花 科小葉 菜類	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10	避免於開花 期使用。	
十字花 科小葉 菜類	小菜蛾	1 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10	避免於開花 期使用。	
十字花 科小葉 菜類	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10	避免於開花 期使用。	
菊科小 葉菜類	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
菊科小 葉菜類	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
菊科小 葉菜類	薊馬類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
茼蒿	夜蛾類	0.8-1.0 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
茄科小 葉菜類	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
枸杞	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10	適用於枸杞 葉。	
蔥科小 葉菜類	夜蛾類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
蔥科小 葉菜類	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
韭	薊馬類	0.8-1.0 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	3		9		
龍鬚菜	夜蛾類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10	避免於開花 期使用。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
龍鬚菜	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10	避免於開花 期使用。	
芹菜	夜蛾類	0.3-3 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
芫荽	夜蛾類	0.3-3 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
羅勒	夜蛾類	0.3-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
紫蘇	夜蛾類	0.3-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
仙草	夜蛾類	0.3-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21		
薄荷	夜蛾類	0.3-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21		
菠菜	夜蛾類	0.8-1.0 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
菠菜	薊馬類	0.3-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
甜菜	薊馬類	0.3-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10	適用於葉用 甜菜。	
莧菜	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
莧菜	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
莧菜	薊馬類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
山蘇	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
山蘇	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
過溝菜 蕨	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
過溝菜 蕨	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
落葵	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
落葵	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
香椿	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
香椿	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			10		
甘藷	夜蛾類	0.3-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3		
豆薯	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3		
豆薯	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3		
狗尾草	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3		
狗尾草	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3		
闊葉大 豆	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3		
闊葉大 豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3		
山藥	夜蛾類	1-1.5 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			6		
山藥	黑盲椿 象	0.8-1.0 公升	1,500	害蟲發生時 開始施藥。	7	最多 2 次		6		
山藥	薊馬類	0.8-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			6		
山藥	優美蘭 葉蜂	1-1.5 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			6		
蘿蔔	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3	避免於開花 期使用。適 用於蘿蔔 根。	
蘿蔔	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3	避免於開花 期使用。適 用於蘿蔔 根。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
蕪菁	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3	避免於開花 期使用。	
蕪菁	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3	避免於開花 期使用。	
山葵	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3	避免於開花 期使用。適 用於山葵根 莖。	
山葵	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3	避免於開花 期使用。適 用於山葵根 莖。	
牛蒡	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3		
牛蒡	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3		
牛蒡	薊馬類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3		
馬鈴薯	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3		
馬鈴薯	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3		
蒜	夜蛾類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9	適用於蒜 頭。	
蒜	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9	適用於蒜 頭。	
洋蔥	夜蛾類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
洋蔥	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
落萵	夜蛾類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9	適用於落萵 頭。	
落萵	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9	適用於落萵 頭。	
珠蔥	夜蛾類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9	適用於紅蔥 頭。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
珠蔥	薊馬類	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9	適用於紅蔥頭。	
胡蘿蔔	夜蛾類	0.8-1.0 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3	適用於胡蘿蔔根。	
胡蘿蔔	夜蛾類	0.8-1.0 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3	適用於胡蘿蔔根。	
甜菜	薊馬類	0.3-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3	適用於甜菜根。	
薑	夜蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3		
金針	夜蛾類	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9	適用於碧玉筍。	
金針	薊馬類	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9	適用於碧玉筍。	
芋	夜蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3		
芋	天蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3		
蘆筍	夜蛾類	1-1.2 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3	避免於開花期使用。	
蘆筍	薊馬類	1-1.2 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			3	避免於開花期使用。	
番茄	夜蛾類	1.0-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
番茄	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
甜椒	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
甜椒	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
辣椒	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
辣椒	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
茄子	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
茄子	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
枸杞	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
枸杞	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
香瓜茄	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
香瓜茄	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
樹番茄	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
樹番茄	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
金針	夜蛾類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9	適用於金針 花。	
金針	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9	適用於金針 花。	
洛神葵	夜蛾類	0.6-1.2 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
秋葵	夜蛾類	0.4-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
秋葵	薊馬類	0.4-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			9		
瓜菜類	夜蛾類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	最多 2 次		6	避免於開花 期使用。	
瓜菜類	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	最多 2 次		6	避免於開花 期使用。	
花豆	螟蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
花豆	夜蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
花豆	毒蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
花豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
樹豆	螟蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
樹豆	夜蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
樹豆	毒蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
樹豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
豌豆	螟蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
豌豆	夜蛾類	0.5-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
豌豆	毒蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
豌豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
菜豆	螟蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
菜豆	夜蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
菜豆	毒蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
菜豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
菜豆	螟蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
菜豆	夜蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
菜豆	毒蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
菜豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
蠶豆	螟蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
蠶豆	夜蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
蠶豆	毒蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
蠶豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
扁豆	螟蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
扁豆	夜蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
扁豆	毒蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
扁豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
翼豆	螟蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
翼豆	夜蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
翼豆	毒蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
翼豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
刀豆	螟蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
刀豆	夜蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
刀豆	毒蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
刀豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
鷹嘴豆	螟蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
鷹嘴豆	夜蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
鷹嘴豆	毒蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
豇豆	螟蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
豇豆	夜蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
豇豆	毒蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
豇豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
瓜果類	夜蛾類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			6	避免於開花 期使用。	
瓜果類	薊馬類	1-1.5 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			6	避免於開花 期使用。	
酪梨	夜蛾類	1-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			12		
酪梨	毒蛾類	1-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			12		
百香果	夜蛾類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			12		
百香果	毒蛾類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			12		
百香果	葉蟬類	0.5-1 公 升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			12		
草莓	葉蟬類	1.25 公 升	800	害蟬發生初 期開始施 藥。	7	共 2 次		5		本項修 正。
葡萄	夜蛾類	1.0-1.2 公升	1,000	結果期害蟲 發生時開始 施藥。	10			30	避免於開花 期使用。	
楊桃	薊馬類	0.5-1.1 公升	1,500	害蟲發生時 開始施藥。	7			12	避免於開花 期使用。	
蓮霧	薊馬類	0.6-2 公 升	1,500	害蟲發生時 開始施藥。				12	避免於開花 期使用。	
番石榴	薊馬類	0.8-1.3 公升	1,500	害蟲發生時 開始施藥。	7			12	避免於開花 期使用。	
檬果	薊馬類	1.5-2.0 公升	1,000	薊馬發生初 期。	7	最多 2 次		12		
楊梅	夜蛾類	1-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
楊梅	毒蛾類	1-2 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			12		
梨	薊馬類	0.7-1.3 公升	1,500	害蟲發生時 開始施藥。	7			15	避免於開花 期使用。	
梨	葉蟬類	0.5-0.7 公升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	10			15	避免於開花 期使用。	
蘋果	夜蛾類	0.4-2.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			15		
蘋果	毒蛾類	0.4-2.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			15		
蘋果	葉蟬類	0.5-0.6 公升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			15		
桃	葉蟬類	0.5-1.0 公升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			15	避免於開花 期使用。	
梅	薊馬類	0.8-1.2 公升	1,500	害蟲發生時 開始施藥。	7			15	避免於開花 期使用。	
梅	葉蟬類	0.6-0.9 公升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			15	避免於開花 期使用。	
李	薊馬類	0.7-1.3 公升	1,500	害蟲發生時 開始施藥。	7			15	避免於開花 期使用。	
枇杷	薊馬類	1-1.3 公 升	1,500	害蟲發生時 開始施藥。	7			15	避免於開花 期使用。	
枇杷	葉蟬類	0.8-1.0 公升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			15	避免於開花 期使用。	
印度棗	夜蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			15		
印度棗	毒蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			15		
印度棗	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,500	害蟲發生時 開始施藥。	7			15		
印度棗	葉蟬類	0.4-0.6 公升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			15		
棗	夜蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			15		
棗	毒蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			15		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
棗	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,500	害蟲發生時 開始施藥。	7			15		
棗	葉蟬類	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			15		
柿	薊馬類	0.7-1 公 升	1,500	害蟲發生時 開始施藥。	7			15		
柑桔類	薊馬類	1-2.4 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			7	避免於開花 期使用。	
花木	夜蛾類	0.6-2.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7				限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
花木	薊馬類	0.6-2.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7				限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
菊	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21		
菊	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21		
菊	薊馬類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21		
洋甘菊	薊馬類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21		
茉莉	薊馬類	0.6-2.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			6		
茶	葉蟬類	1 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。				21	避免於開花 期使用。	
茶	神澤氏 葉蟬	1 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。				21	避免於開花 期使用。	
黃耆	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21		
黃耆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
風茹	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21		
風茹	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21		
風茹	薊馬類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21		
艾草	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21		
艾草	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21		
艾草	薊馬類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21		
當歸	夜蛾類	0.3-3 公 升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21		
丹參	夜蛾類	0.3-0.8 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21		
薑黃	夜蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7			21		
蘭科作 物	檢疫處 理			檢疫處理時 施藥 1 次。					施藥量及稀 釋倍數依輸 入國之規定 處理。	