

檔 號：
保存年限：

臺中市政府 函

地址：420018臺中市豐原區陽明街36號
承辦人：技士 張仲萍
電話：0422289111+56108
電子信箱：dj950324@taichung.gov.tw

受文者：臺中市大里區公所


發文日期：中華民國114年11月17日
發文字號：府授農作字第1140353267號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (387270000G_1140353267_ATTACH1. pdf、
387270000G_1140353267_ATTACH2. pdf、387270000G_1140353267_ATTACH3. pdf、
387270000G_1140353267_ATTACH4. pdf、387270000G_1140353267_ATTACH5. pdf)

主旨：檢送農業部公告修正「得恩地、賽安勃」農藥使用方法及
其範圍等相關資料，請協助公告周知，轉請查照。

說明：依據農業部114年11月13日農授防字第1141878655號書函辦
理。

正本：臺中市植物保護商業同業公會、臺中市各區公所、臺中市各區農會
副本：臺中市政府農業局



農建課 收文:114/11/17



AA1140033944 有附件

農業部 書函

地址：100212臺北市南海路37號
承辦人：王筱婷
電話：(02)3343-6430
傳真：(02)2304-7355
電子信箱：htwang@aphia.gov.tw

受文者：臺中市政府

發文日期：中華民國114年11月13日
發文字號：農授防字第1141878655號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：公告pdf檔、公告(稿)odf檔、附件pdf檔(副本受文者請至本部動植物防疫檢疫署
網站下載<https://www.aphia.gov.tw/>，驗證序號：1141878655)

主旨：檢送本部公告修正「得恩地、賽安勃」農藥使用方法及其
範圍（含附件）各1份，請刊登行政院公報。

正本：行政院公報編印中心（請刊登公報）

副本：衛生福利部食品藥物管理署、環境部、經濟部標準檢驗局、臺北市政府、新北市
政府、桃園市政府、新竹縣政府、新竹市政府、苗栗縣政府、臺中市政府、南投
縣政府、彰化縣政府、雲林縣動植物防疫所、嘉義市政府、嘉義縣政府、臺南市
政府、高雄市政府、屏東縣政府、基隆市政府、宜蘭縣政府、花蓮縣動植物防疫
所、臺東縣政府、金門縣政府、連江縣政府、澎湖縣政府、臺灣植物保護工業同
業公會、中華民國植物保護商業同業公會全國聯合會、臺北市植物保護商業同業
公會、作物永續發展協會臺灣分會、本部農糧署、本部農業試驗所、本部農業藥
物試驗所、本部桃園區農業改良場、本部臺中區農業改良場、本部苗栗區農業改
良場、本部臺南區農業改良場、本部高雄區農業改良場、本部花蓮區農業改良
場、本部臺東區農業改良場、本部茶及飲料作物改良場、本部種苗改良繁殖場



農業部 公告

發文日期：中華民國114年11月13日
發文字號：農授防字第1141878655A號



主旨：公告修正「得恩地」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

公告事項：新增80%(w/w)得恩地水分散性粒劑(WG)之使用範圍
(此範圍為業者申請80%WP變更為較安全劑型)。

部長 陳駱季

「得恩地」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 11 月 13 日農授防字第 1141878655A 號公告修正

一、變更安全劑型一覽表

農藥名稱	登記廠商名稱	變更日期	備註
80% 得恩地 水分散性粒劑	高事達農化有限公司	114 年 11 月 13 日	本藥劑係 80%得恩地可溼性粉劑轉換為更安全劑型

二、「得恩地」農藥使用方法與範圍一覽表

40(%) (w/w) 得恩地 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
檬果	炭疽病	4-5 公升	500	開花初期開始施藥。	7			30	最後一次施藥後，藥液乾後即套袋。	

65(%) (w/w) 得恩地 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
葡萄	晚腐病	1.3-2.7 公斤	600	謝花幼果期施藥。	7			15		
楊桃	炭疽病	1.3-2.7 公斤	600	謝花幼果期施藥。	7			15		
蓮霧	炭疽病	1.7-5.0 公斤	600	謝花幼果期施藥。	7			15		
番石榴	炭疽病	2.0-3.3 公斤	600	謝花幼果期施藥。	7			15		
無花果	炭疽病	1.3-2.7 公斤	600	謝花幼果期施藥。	7			15		
桃	縮葉病		160	病害發生初期開始施藥。					使用時加展著劑	
鐘麻	腰折病	17-18 公斤	1,000	播種前施藥。						

80(%) (w/w) 得恩地 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
草莓	灰黴病	2 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次		15		
葡萄	晚腐病	1-2 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
楊桃	炭疽病	1-2 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
蓮霧	炭疽病	1.3-3.8 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
番石榴	炭疽病	1.5-2.5 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
無花果	炭疽病	1-2 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
檬果	炭疽病		800	開花初期施藥。				30	1. 開花初期開始施藥，以後每隔 7 天施藥 1 次，連續 4 次。 2. 結果後每隔 14 天施藥 1 次，至套袋為止。	
桃	縮葉病		200	病害發生初期開始施藥。					使用時加展著劑。	
鐘麻	腰折病		1,200	病害發生初期開始施藥。						
蘭科作物	檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。			確定藥劑密布全株。		施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	
輸入植物檢疫物	檢疫處理								依「輸入植物檢疫物檢疫處理消毒方法」	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									之規定處理。	
觀賞植物	苗檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。			確定藥劑密布全株。		施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	
蔬菜	種子檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	

80(%) (w/w) 得恩地 水分散性粒劑 (WG)


作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
草莓	灰黴病	2 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次		15		變更安全劑型
葡萄	晚腐病	1-2 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
楊桃	炭疽病	1-2 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
蓮霧	炭疽病	1.3-3.8 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
番石榴	炭疽病	1.5-2.5 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
無花果	炭疽病	1-2 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
檬果	炭疽病		800	開花初期施藥。				30	1. 開花初期開始施藥，以後每隔 7 天施藥 1 次，連續 4 次。 2. 結果後每隔 14 天施藥 1 次，至套袋為止。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
桃	縮葉病		200	病害發生 初期開始 施藥。					使用時加展著 劑。	
鐘麻	腰折病		1,200	病害發生 初期開始 施藥。						
蘭科作 物	檢疫處 理			檢疫處理 時施藥 1 次。			確定藥 劑密布 全株。		施藥量及稀釋 倍數依輸入國 之規定處理。	
輸入植 物檢疫 物	檢疫處 理								依「輸入植物 檢疫物檢疫處 理消毒方法」 之規定處理。	
觀賞植 物	苗檢疫 處理			檢疫處理 時施藥 1 次。			確定藥 劑密布 全株。		施藥量及稀釋 倍數依輸入國 之規定處理。	
蔬菜	種子檢 疫處理			檢疫處理 時施藥 1 次。					施藥量及稀釋 倍數依輸入國 之規定處理。	

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國114年11月13日
發文字號：農授防字第1141878655B號



主旨：公告修正「賽安勃」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駱季

「賽安勃」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 11 月 13 日農授防字第 1141878655B 號公告修正

10.26(%) (w/w) 賽安勃 水分散性油懸劑 (OD)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
十字花 科包葉 菜類	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		7		
番茄	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
甜椒	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
辣椒	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
茄子	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
枸杞	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
香瓜茄	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
樹番茄	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3		
瓜菜類	粉蝨類	0.625 公升	800	平均每葉 成蟲數達 1 隻以上 1 週後開 始施藥。	7	連續 2 次	藥液量 500 公升 /公頃， 藥劑量 0.625 公 升/公 頃。	4	避免於開花 期使用。	
大豆	粉蝨類	0.625	800	害蟲發生	7	共 2		3	適用於毛	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		時開始施 藥。		次			豆。	
大豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於毛 豆。	
花豆	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
花豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
樹豆	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
樹豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
豌豆	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
豌豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
菜豆	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
菜豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
菜豆	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
菜豆	斑潛蠅 類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	
蠶豆	粉蝨類	0.625 公升	800	害蟲發生 時開始施	7	共 2 次		3	適用於鮮 豆。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				藥。						
蠶豆	斑潛蠅類	0.625公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7	共2次		3	適用於鮮豆。	
扁豆	粉蝨類	0.625公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7	共2次		3	適用於鮮豆。	
扁豆	斑潛蠅類	0.625公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7	共2次		3	適用於鮮豆。	
翼豆	粉蝨類	0.625公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7	共2次		3	適用於鮮豆。	
翼豆	斑潛蠅類	0.625公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7	共2次		3	適用於鮮豆。	
刀豆	粉蝨類	0.625公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7	共2次		3	適用於鮮豆。	
刀豆	斑潛蠅類	0.625公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7	共2次		3	適用於鮮豆。	
豇豆	粉蝨類	0.625公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7	共2次		3	適用於鮮豆。	
豇豆	斑潛蠅類	0.625公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7	共2次		3	適用於鮮豆。	
瓜果類	粉蝨類	0.625公升	800	平均每葉成蟲數達1隻以上1週後開始施藥。	7	連續2次	藥液量500公升/公頃，藥劑量0.625公升/公頃。	4	避免於開花期使用。	

10.2(%) (w/w) 賽安勃 濃懸乳劑 (SE)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科包葉菜類	小菜蛾	0.33 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				7		
荔枝	荔枝細蛾	0.5 公升	3,000	花落後 10-20 天開始施藥。	15	共 2 次		14		
檬果	螟蛾類	0.5 公升	3,000	新梢抽出後開始施藥。	15	連續 2 次		21	避免於開花期使用影響授粉昆蟲。	
山茶	毒蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。						
山茶	避債蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。						
茶	毒蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶葉。	
茶	捲葉蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶葉。	
茶	避債蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶葉。	
十字花科包葉菜類	小菜蛾	0.33 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				7		

18.41(%) (w/w) 賽安勃 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
番茄、 甜椒、 茄子、 辣椒、 枸杞、 香瓜 茄、 樹番茄	粉蝨類	0.5 公 升	2,000	植株移植 後 7 天， 每株灌注 藥液 50 毫升 1 次。					限苗期使 用，依使用 方法用藥， 不須訂定安 全採收期。	本 項 新 增。原始 登 記 廠 商名稱： 台 灣 富 美 實 有 限公司。