

「得芬瑞」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 7 月 21 日農授防字第 1111489304A 號公告修正

10 (%) 得芬瑞 可溼性粉劑 (WP)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期 (天)	注意事項	說明
香蕉	葉蟬類	0.1-0.5 公斤	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			6		
木瓜	神澤氏 葉蟬	1.0-1.5 公斤	2,000	害蟬發生 時施藥 1 次。				6		
番荔枝	葉蟬類	0.4-0.8 公斤	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			6		
酪梨	葉蟬類	0.5-1.0 公斤	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			6		
草莓	二點葉 蟬	0.3-0.4 公斤	3,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7	2	噴藥 時應 全株 均勻 噴佈。	7	建議清晨或傍晚施 藥。	
楊桃	葉蟬類	0.4-0.8 公斤	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			7		
蓮霧	葉蟬類	0.5-1.5 公斤	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			7		
番石榴	葉蟬類	0.6-1 公 斤	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			7		
龍眼	葉蟬類	0.3-0.6 公斤	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			6		
荔枝	葉蟬類	0.3-0.6	2,000	害蟬發生	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期 (天)	注意事項	說明
		公斤		時開始施藥。						
檬果	葉蟬類	0.5-1.0 公斤	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			6		
印度棗	柑桔葉 蟬	0.3-0.4 公斤	3,000	害蟬發生 時施藥 1 次。				6		本項修 正。
柑桔類	柑桔葉 蟬	0.67 公 斤	3,000	害蟬發生 時開始施 藥。				9		
花木	葉蟬類	0.6-2.5 公斤	1,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7	最多 2 次			1. 限觀賞花卉使 用，使用前宜先 進行小面積藥害 測試。 2. 可能引起薔薇嫩 葉發生藥害。	本項修 正。
菊	葉蟬類	0.35 公 斤	3,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			18		
茉莉	葉蟬類	0.33-0.83 公斤	3,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			6		本項修 正。
茶	葉蟬類	0.35 公 斤	3,000	害蟬發生 時開始施 藥。				18		
番茄	葉蟬類	0.17-0.5 公斤	3,000	害蟬發生 初期開始 施藥。	7	最多 2 次		3		本項新 增。
甜椒	葉蟬類	0.17-0.5 公斤	3,000	害蟬發生 初期開始 施藥。	7	最多 2 次		3		本項新 增。
茄子	葉蟬類	0.17-0.5 公斤	3,000	害蟬發生 初期開始 施藥。	7	最多 2 次		3		本項新 增。
辣椒	葉蟬類	0.17-0.5	3,000	害蟬發生	7	最多		3		本項新

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期 (天)	注意事項	說明
		公斤		初期開始 施藥。		2 次				增。
枸杞	葉蟬類	0.17-0.5 公斤	3,000	害蟬發生 初期開始 施藥。	7	最多 2 次		3		本項新 增。
香瓜茄	葉蟬類	0.17-0.5 公斤	3,000	害蟬發生 初期開始 施藥。	7	最多 2 次		3		本項新 增。
樹番茄	葉蟬類	0.17-0.5 公斤	3,000	害蟬發生 初期開始 施藥。	7	最多 2 次		3		本項新 增。